

Eaca[®] Balsâmico

ácido épsilon-aminocapróico, benzoato de sódio,
guaifenesina e cloreto de amônio

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

Xarope. Embalagem contendo frasco com 100 ml.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

Cada ml contém:

ácido épsilon-aminocapróico	25 mg
benzoato de sódio	50 mg
guaifenesina (éter gliceril-guaiacólico)	10 mg
cloreto de amônio	10 mg
veículo q.s.p.	1 ml

excipientes: sacarina, metilparabeno, essências de cereja e de framboesa, corante caramelo, sacarose e água.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

EACA[®] Balsâmico destina-se à expectoração e ao alívio da tosse. **EACA[®] Balsâmico** deve ser guardado na sua embalagem original, em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C). Nestas condições, este medicamento possui prazo de validade a partir da data de fabricação (vide embalagem externa). Este, como qualquer outro produto, não deve ser usado, após vencido o prazo de validade ou caso suas características físicas estejam alteradas. Ao comprar um medicamento, verifique se a embalagem está íntegra. **EACA[®] Balsâmico**, assim como qualquer outro medicamento, não deve ser utilizado durante a gravidez e amamentação, a não ser sob estrita orientação médica. Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez ou se está amamentando na vigência do tratamento ou após o seu término. Para que o tratamento com **EACA[®] Balsâmico** forneça os resultados esperados, siga a orientação do seu médico, respeitando sempre o modo de usar, os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento, sem o conhecimento do seu médico. Não desaparecendo os sintomas, retorne ao seu médico. Informe ao seu médico o aparecimento de reações desagradáveis.

TUDO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Não há restrições quanto à alimentação ou outra medicação que necessite ser utilizada junto com **EACA[®] Balsâmico**. Mesmo assim, informe ao seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início ou durante o tratamento.

NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DE SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

EACA[®] Balsâmico atua, fundamentalmente, como fluidificante e expectorante das secreções brônquicas, sem interferir com o reflexo da tosse. O ácido épsilon-aminocapróico, inibidor de enzimas proteolíticas, reduz a resposta inflamatória. A guaifenesina, também denominada éter gliceril-guaiacólico, determina a produção de muco fluido, reduzindo a viscosidade, a tensão superficial e a adesividade do muco na árvore respiratória. O aumento do fluxo e a diminuição da viscosidade permitem um aumento na motilidade ciliar, facilitando a remoção do muco. O benzoato de sódio e o cloreto de amônio apresentam propriedades expectorantes aditivas às da guaifenesina, auxiliando na eliminação do excesso de muco da árvore respiratória, desta forma, facilitando a respiração.

INDICAÇÕES

EACA[®] Balsâmico está indicado para o tratamento das afecções de natureza inflamatória do aparelho respiratório, como fluidificante e expectorante das secreções brônquicas. Como coadjuvante no tratamento das crises asmáticas e asmatiformes.

CONTRA-INDICAÇÕES

EACA® Balsâmico está contra-indicado em pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Durante a gravidez e lactação, o produto deve ser utilizado sob estrita orientação médica. Como qualquer outro medicamento, não se recomenda sua utilização no primeiro trimestre da gravidez.

Atenção: Este medicamento contém Açúcar, portanto, deve ser usado com cautela em portadores de Diabetes.

Este medicamento não deve ser utilizado em crianças menores de 2 anos de idade.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Até o momento, não foram observadas interações com outros medicamentos.

REAÇÕES ADVERSAS

Em geral, **EACA® Balsâmico** é muito bem tolerado, sendo a incidência de efeitos colaterais pouco freqüente. Raramente, podem ocorrer reações, tais como: zumbido, gastralgia, fraqueza, diarreia, náusea ou vômito.

POSOLOGIA E MODO DE USAR

Adultos: 10 ml (uma colher de sobremesa), de quatro em quatro horas, a critério médico.

Crianças de 2 até 10 anos: 5 ml (uma colher de chá), de quatro em quatro horas, a critério médico.

SUPERDOSAGEM

Até o momento, não existem relatos de casos de superdosagem.

PACIENTES IDOSOS

Não há advertências ou recomendações especiais, sobre o uso do produto em pacientes idosos.

Reg. MS nº 1.0014.0018

Farm. Responsável: Dr. José Vicente Corrêa da Silva — CRF/RJ nº 3899

QUÍMICA E FARMACÊUTICA NIKKHO DO BRASIL Ltda.

Rua Jaime Perdigão, 431/445 — Ilha do Governador

Rio de Janeiro — RJ — BRASIL

C.N.P.J. 33.517.558/0001-06

Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 282 9911

INDÚSTRIA BRASILEIRA



VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Número do lote, data de fabricação e prazo de validade: VIDE EMBALAGEM EXTERNA.